








### Sanitärbereich

WAS? soll gereinigt oder desinfiziert werden	WANN? Zeitpunkt, Rhythmus der Maßnahmen	WIE? Art der Anwendung	WOMIT? Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittel / Konzentration / Einwirkzeit	WER? Verantwortliche oder betroffene Person
 <b>Armaturen, Waschbecken, kompl. Sanitärgegenstände</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x täglich nach Betriebsende</li> <li>• bei Bedarf (Routinedesinfektion)</li> </ul>	<b>reinigen</b>  <b>desinfizierend abwischen</b>	<b>Sanitär-Unterhaltsreiniger TR 30</b>  <b>siehe Desinfektionsmittel für große Flächen B</b>	Reinigungspersonal  Kindergarten- oder Reinigungspersonal
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• im Verdachts- oder Ausbruchsfall</li> </ul>	<b>desinfizierend abwischen</b>	<b>siehe Desinfektionsmittel für große Flächen D</b> (ggfls. auch Desinfektionsmittel für kleine Flächen C)	
 <b>Toilettensitze</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x täglich bei Betriebsende</li> <li>• und bei Bedarf</li> <li>• bei Bedarf und Kontamination</li> </ul>	<b>reinigen</b>  <b>desinfizieren abwischen,</b> vor Wiederbenutzung mit klarem Wasser abspülen	<b>Sanitär-Unterhaltsreiniger TR 30</b>  <b>siehe Desinfektionsmittel für kleine Flächen A</b>	Kindergarten- oder Reinigungspersonal  Kindergarten- oder Reinigungspersonal
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nach Benutzung</li> <li>• bei Bedarf (Kontamination)</li> </ul>	<b>reinigen</b>  <b>desinfizierend abwischen</b>	<b>Sanitär-Unterhaltsreiniger TR 30</b>  <b>siehe Desinfektionsmittel für große Flächen B</b>	Kindergarten- oder Reinigungspersonal
 <b>Dusche (evtl. Badewanne)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nach Benutzung</li> <li>• bei Bedarf (Kontamination)</li> </ul>	<b>reinigen</b>  <b>desinfizierend abwischen</b>	<b>Sanitär-Unterhaltsreiniger TR 30</b>  <b>siehe Desinfektionsmittel für große Flächen B</b>	Kindergarten- oder Reinigungspersonal
 <b>Wickeltischauflege</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nach jedem Wickelvorgang</li> </ul>	<b>desinfizierend abwischen</b>	<b>siehe Desinfektionsmittel für kleine Flächen A</b>	Kindergartenpersonal
 <b>Fußboden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• täglich</li> </ul>	<b>nass reinigen</b> 2-Eimer-Methode oder Mopp-System	<b>Sanitär-Unterhaltsreiniger TR 30</b> (oder Bodenreiniger)	Reinigungspersonal
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei Bedarf (Routinedesinfektion)</li> </ul>	<b>desinfizierend wischen</b>	<b>siehe Desinfektionsmittel für große Flächen B</b>	Kindergarten- oder Reinigungspersonal
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• im Verdachts- oder Ausbruchsfall</li> </ul>	<b>desinfizierend wischen</b>	<b>siehe Desinfektionsmittel für große Flächen D</b>	
<b>Spender</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei jedem Flaschenwechsel</li> </ul>	desinfizierende Feucht-Wisch-Methode, nicht nachtrocknen	<b>siehe Desinfektionsmittel für kleine Flächen A</b>	Kindergarten- oder Reinigungspersonal

**Hinweise: Alle Desinfektionsmittel sind geprüft und anerkannt vom VAH (Verbund für Angewandte Hygiene e.V.) und gegen COVID-19-Viren wirksam.**

Eine Desinfektion sollte im Bedarfsfall und generell bei Verdacht auf infektiöse Erkrankungen durchgeführt werden (Meningitis, wiederholter Durchfall etc.), um eine Ausbreitung zu vermeiden. Bei meldepflichtigen Erkrankungen ist das örtliche Gesundheitsamt zu informieren. Ein Desinfektionserfolg ist nur dort gegeben, wo ein Feuchtigkeitsfilm nachgewiesen werden kann: Bitte unbedingt die Einwirkzeiten einhalten. Schutzhandschuhe: Zum Schutz vor Kontamination mit möglicherweise infektiösen Substanzen wie Blut, Stuhl, Urin, Sekreten.

Zusätzliche Hinweise können Sie dem BGR 250/TRGA 250 (Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege) entnehmen. ([www.bgw-online.de/internet/preview?id=914](http://www.bgw-online.de/internet/preview?id=914))

Haben Sie noch Fragen? Unsere Außendienstmitarbeiter beraten Sie gern.

# FLÄCHEN-DESINFEKTIONSMITTEL

Empfehlung für Kindergärten, Kindertagesstätten und Schulen

<div style="text-align: right;"><b>Fläche</b></div> <div style="text-align: left;"><b>Anwendung</b></div>	<b>Kleine Flächen</b> (bis ca. 2 m <sup>2</sup> )	<b>Große Flächen</b>
<b>Prophylaxe</b>	<p style="text-align: center;"><b>A</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>FRANKEN Green SG Flächendesinfektion</b> gebrauchsfertige Lösung -&gt; Einwirkzeit 1 Min. (Gutachten) / 5 Min. (VAH)</p> <p><input type="checkbox"/> <b>FrankoDes</b> gebrauchsfertige alkoholische Lösung -&gt; Einwirkzeit 1 Min. (Gutachten) / 5 Min. (VAH)**</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Franko-Nol Plus</b> gebrauchsfertige alkoholische Lösung -&gt; Einwirkzeit 1 Min. (DGHM) / 5 Min. (VAH)*</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Franko-Fix Plus</b> feuchte Einmal-Desinfektionstücher -&gt; Einwirkzeit 5 Min.</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Franko-Fix Bio</b> feuchte Einmal-Desinfektionstücher -&gt; Einwirkzeit 1 Min. (Noroviren 30 Min.)</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p>	<p style="text-align: center;"><b>B</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>FRANKO-CID N</b> 1,0 %-ige Lösung <math>\cong</math> 2 Dosierkappen = 40 ml auf 4 l Wasser -&gt; Einwirkzeit 15 Min.</p> <p><input type="checkbox"/> <b>FRANKEN Green SG Flächendesinfektion</b> gebrauchsfertige Lösung -&gt; Einwirkzeit 1 Min. (Gutachten) / 5 Min. (VAH)</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p>
<b>im Ausbruchsfall</b>	<p style="text-align: center;"><b>C</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Descogen® Oxy Wipes</b> feuchte Einmal-Desinfektionstücher -&gt; Einwirkzeit 30 Min.</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Descogen® Liquid r.f.u.</b> gebrauchsfertige alkoholische Lösung -&gt; Einwirkzeit 30 Min.</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p>	<p style="text-align: center;"><b>D</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Dismozon® plus</b> 1,6 %-ige Lösung <math>\cong</math> 1 Beutel auf 1 l Wasser -&gt; Einwirkzeit 15 Min. (VAH) 3,6 %-ige Lösung <math>\cong</math> 1 Beutel auf 444 ml Wasser -&gt; Einwirkzeit 4 Std. (RKI)</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Descogen® Liquid Konzentrat</b> 3 %-ige Lösung <math>\cong</math> 6 Dosierkappen = 120 ml auf 4 l Wasser -&gt; Einwirkzeit 30 Min.</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p>

Hier können Sie die Produkte markieren, welche in Ihrer Einrichtung verwendet werden.

**Hinweise: Alle Desinfektionsmittel sind geprüft und anerkannt vom VAH (Verbund für Angewandte Hygiene e.V.) und wirksam gegen COVID-19-Viren.**

Eine Desinfektion sollte im Bedarfsfall und generell bei Verdacht auf infektiöse Erkrankungen durchgeführt werden (Meningitis, wiederholter Durchfall etc.), um eine Ausbreitung zu vermeiden. Bei meldepflichtigen Erkrankungen ist das örtliche Gesundheitsamt zu informieren. Ein Desinfektionserfolg ist nur dort gegeben, wo ein Feuchtigkeitseffekt nachgewiesen werden kann. Bitte unbedingt die Einwirkzeiten einhalten. Schutzhandschuhe: Zum Schutz vor Kontamination mit möglicherweise infektiösen Substanzen wie Blut, Stuhl, Urin, Sekreten.

Zusätzliche Hinweise können Sie dem BGR 250/TRGA 250 (Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege) entnehmen. ([www.bgw-online.de/internet/preview?id=914](http://www.bgw-online.de/internet/preview?id=914))

\* Rotavirus gem. EN 14476 -> 5 Min.; Norovirus gem. EN 14476 -> 1 Min. Einwirkzeit.

\*\* Rotavirus -> 30 Sek.; Norovirus -> 5 Min. Einwirkzeit.

Haben Sie noch Fragen? Unsere Außendienstmitarbeiter beraten Sie gern.